ERTISSEM

STATIONS D'AVERTISSEMENTS

GRANDES CULTURES

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 183 du 28/07/92



MAIS Pyrale

Premiers dégâts visibles

Pucerons

Pas d'évolution

BETTERAVE

Maladies

Cercosporiose

Rhizomanie

En extension

Dégâts de grêle

Le soleil est là!

MAIS

Stade floraison femelle.

Wale

☐ Situation

Le vol et les pontes de pyrales se poursuivent. L'activité est plus importante que ces dernières années.

Il n'est pas rare, en particulier en Haute-Marne, que le seuil économique de 10 pontes pour 100 pieds observés soit atteint (16 % à Choignes).

On observe à l'heure actuelle de nouvelles pénétrations larvaires.

Les premiers dégâts (panicules mâles cassés) sont visibles en Haute-Marne et dans la Marne.

LIEU	CAPTURES CUMULEES
10	
St Pouange	28
Rumilly les Vaudes	19
51	
Muizon	16
Sarcy	30
Unchair	14

☐ Préconisation

Le traitement insecticide a dû être réalisé dans les zones à risque. Il est maintenant trop tard pour intervenir. Dans le cas d'utilisation d'insecticides liquides, surveiller ces parcelles, de nouvelles infestations de pucerons peuvent se produire.


Agricoles, appelez le 36.17 code SIR

Pucerons

☐ Situation

Depuis la forte diminution des populations de pucerons, on observe une stabilisation desinfestations qui restent, pour l'instant, faibles.

A la tour de Lavannes, on constate également une très nette diminution des captures



☐ Préconisation

Une intervention spécifique n'est pas nécessaire.

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL 240 F 62, avenue Nationale - La Neuvillette

Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

Ministère de l'Agriculture

Service Régional de la Protection des Végétaux

B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX

Téléphone: 26.09.06.43 Fax: 26.87.39.33



BOUCHET - CFPPAP nº 529 AD (C SPV 1989)

REIMS

BETTERAVE = 2 Chizomanie

Maladies

☐ Situation

La situation est saine dans la plupart des secteurs. On observe cependant des démarrages de cercosporiose dans quelques parcelles.

L'alternaria est toujours la maladie dominante et évolue parfois assez vite.

L'oïdiumest très rare mais risque de se développer dans les prochains jours. On note l'absence de la rouille et de la ramulariose jusqu'à présent.

□ Préconisation

Un premier fongicide est justifié dès maintenant pour les parcelles où la cercosporiose ou l'oïdium est observé.

Continuer à surveiller les parcelles.

Depuis la forte diminution des populations de

nucerons, on observe une stabilisation des infestations

☐ Situation

Celle-ci est bien visible sur le secteur de Pomacle, Fresnes les Reims et est en recrudescence.

□ Préconisation

Seul l'emploi de variétés tolérantes type Rhizor doit être envisagé dans les secteurs atteints.

(Degâts de grêle


☐ Situation

Le secteur de Berru (Nord de Reims) a été fortement touché, il y a une dizaine de jours. Des parcelles de betteraves ont été très complètement défoliées. La meilleure cicatrisation est l'action du soleil ce qui heureusement a été le cas la semaine dernière.

☐ Préconisation

Aucun fongicide spécifique n'est nécessaire et aurait été efficace compte-tenu de la défoliation complète.

Reconnaître les maladies de la betterave



Pour recevoir les informations spécifiques LUZERNE et POMME DE TERRE, appelez - nous au 26.09.06.43

Pour consulter nos Avertissements Agricoles, appelez le 36.17 code SIRTEL.

infestations de puessons pauvent se produire.

intervenir. Dans le cax d'utilisation d'insecticides liquides; throciller cesoparcelles, de nouvelles